

Naziv biocida: **BROMOTRID BLOK**

Vrsta i oblik pripravka: Gotovi mamac u obliku parafinskog bloka. U mamac je dodana gorka tvar.

Namjena: Rodenticid

Aktivna tvar i koncentracija u metričkim jedinicama: jedan kilogram mamca sadrži 0,05 g bromadiolona

S: 2-13-20/21-36/37-46-49 (čuvati izvan dohvata djece; čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane; pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti; nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice; ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; čuvati samo u originalnom spremniku)

Upute za uporabu i doziranje:

BROMOTRID BLOK su već pripremljeni mamci crvenkaste boje za direktnu primjenu protiv štakora i miševa. Korisni su u unutarnjim i vanjskim, posebice vlažnim prostorima. Upotrebljavaju se u kanalizacijskoj mreži i podzemnim tunelima raznih namjena. Mogu biti izrađeni bez žice ili sa žicom koja omogućuje fiksiranje bloka za podlogu i tretiranje kanalizacijskog otvora.

Koriste se u području javnog zdravstva, komunalne higijene i veterinarstvu.

BROMOTRID BLOK su antikoagulantni mamci za jednokratno hranjenje. Mamcima je potrebno od jednom tretirati što veći prostor. Postavljaju se u blizini i u samim nastambama glodavaca, u kutove zidova i duž staza kojima se glodavci kreću te na mjestima hranjenja.

BROMOTRID BLOK mamci se doziraju u namjenske kutijice za deratizaciju u količini od 2 bloka za suzbijanje štakora, a 1 blok za suzbijanje miševa. Mamci se redovito moraju nadomjestiti ovisno o dinamici konzumacije. Uginule glodavce treba ukloniti kako ne bi došlo do sekundarnog trovanja.

Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

Podaci o bilo kakvoj opasnosti po okoliš: aktivna tvar bromadiolon je toksičan za ribe i životinje koje se koriste kao hrana ribama i za alge. BROMOTRID BLOK mamci ne smiju biti na dohvat domaćih životinja, maloj djeci, peradi i divljači.

Količina: otisnuta na pakiranju

Datum proizvodnje: otisnuto na pakiranju

Rok trajanja: 3 godine

Broj šarže ili serijski broj: otisnuto na pakiranju

Klasa i urudžbeni broj odobrenja MZSS: Klasa: UP/I-543-04/10-05/172, Ur.br. 534-08-01-4/3-10-2 (od 14.4.2010.)

Proizvođač: Pestrid d.o.o. Bilje, Šandora Petefija 109, 31 327 Bilje, Tel. 031/750-166

Zemlja podrijetla: Hrvatska

Napomena: Pročitaj priloženu uputu prije uporabe.



(Word to PDF Converter - Unregistered) <http://www.Word-to-PDF-Converter.net>Ovaj dokument sukladan je odobrenju Hrvatskog zavoda za toksikologiju, klasa br. 060-08-01/10-286, ur. br.

02-01/10-1783.

Ovom ovjerom poništava se ovjera deklaracije i upute koja je izdana pod klasom br. **060-08-01/10-082, ur. br. 02-01/10-0528 od 11.03.2010.**

-

Naziv biocida: BROMOTRID BLOK

Vrsta i oblik pripravka: Gotovi mamac u obliku parafinskog bloka. U mamac je dodana gorka tvar.

Namjena: RODENTICID

UPUTA ZA UPORABU I SIGURAN RAD**Razdoblje potrebno za biocidni učinak:** 3 do 7 dana**Vrijeme koje mora proteći između dviju primjena biocidnog pripravka:**

Kontrolu pojedenosti mamaca potrebno vršiti svakih 14 dana i po potrebi nadopunjavati. Postupak ponavljati do potpunog suzbijanja glodavaca.

Mjesta primjene:

Korisni su u unutarnjim, posebice vlažnim prostorima, kao i vanjskim budući da su otporni na vlagu. Upotrebljavaju se u kanalizacijskoj mreži i podzemnim tunelima raznih namjena. Mogu biti izrađeni bez žice ili sa žicom koja omogućuje fiksiranje bloka za podlogu i tretiranje kanalizacijskog otvora. Postavljaju se u blizini i u samim nastambama glodavaca, u kuteve zidova i duž staza kojima se glodavci kreću te na mjestima hranjenja.

Upute o mjerama opreza tijekom uporabe:

Osigurati da primjenu preparata provode za to osposobljene osobe. Kod rada ne jesti, piti niti pušiti. Pri radu s preparatom potrebno je provoditi opće mjere zaštite na radu te koristiti osobnu zaštitnu opremu. U normalnim uvjetima pri dobroj ventilaciji, zaštita dišnog sustava nije potrebna. Ruke zaštititi gumenim rukavicama (HRN EN 374), a tijelo laganim zaštitnim pamučnim odijelom dugih rukava. Nakon rada dobro oprati ruke i izložene dijelove tijela vodom i sapunom. Kontaminiranu odjeću skinuti.

Simptomi trovanja:

Simptomi trovanja obično nastaju s latencijom 16-72 sata, a to su: malaksalost, umor, nesiguran hod, krvarenje različitog stupnja na koži i sluznici, hematurija, krvava stolica, a može doći i do teških krvarenja u mozgu, perikardu, toraksu, nadbubrežnim žlijezdama, retini i probavnom traktu.


Udisanje: može se pojaviti krvarenje iz sluznice nosa te ostalih dijelova respiratornog sustava. **Dodir s kožom:** može doći do iritacije koja uključuje crvenilo, a može doći i do potkožnog krvarenja. **Gutanje:** može se pojaviti krvarenje u usnoj šupljini, ždrijelu, s iznenadnim bolovima u trbuhu, s pojavom krvi u mokraći i stolici.**Upute za pružanje prve pomoći:****Nakon udisanja:** unesrećenu osobu izvesti iz kontaminiranog prostora na svjež zrak. U slučaju pojave ili zadržavanja simptoma, potražiti savjet liječnika ili prevesti unesrećenog u najbližu bolnicu. **Nakon dodira s kožom:** skinuti kontaminiranu odjeću i obuću. Mjesta dodira ispirati s tekućom vodom i blagom sapunicom 15-ak minuta. U slučaju pojave i zadržavanja simptoma, potražiti pomoć liječnika. **Nakon dodira s očima:** čistim prstima razmaknuti kapke te ispirati oči naizmjenični s tekućom vodom 15-ak minuta. U slučaju zadržavanja simptoma, potražiti pomoć oftalmologa. **Nakon gutanja:** Ne izazivati povraćanje, isprati usta s malo vode i ispljunuti, odmah prevesti unesrećenog u najbližu zdravstvenu ustanovu.**ANTIDOT: VITAMIN K1.****Postupci u slučaju nesreće:****Rasuto sredstvo,** uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava treba temeljito mehanički sakupiti i staviti u spremnik koji je predviđen za tu namjenu. Zagađena podloga se potom opere smjesom vode i deterdženta, koja se nakon upotrebe treba odložiti u kontejner s otpadnim sredstvom.**Ako je prostor zahvatio požar,** odmah se pristupa gašenju s CO₂, prahom, pjenom otpornom na alkohol ili vodenom maglom uz obveznu upotrebu samostalnog uređaja za disanje (npr. sa stlačenim zrakom - HRN EN 137) i termootpornog odijela.

Nakon čišćenja ili gašenja požara, osoba koja je to radila treba se otuširati.

U slučaju većih prosiavanja, dospijevanja u okoliš ili požara, obavijestiti odgovornu osobu i DUZS na broj 112. U slučaju požara, obavijestiti odgovornu osobu i DUZS.

Upute o mjerama opreza tijekom skladištenja:


Skladištiti samo u zatvorenom originalnom pakovanju, u posebnoj prostoriji izvan dohvata djece, na suhom, prohladnom i dobro zračenom mjestu, odvojeno od hrane, pića i stočne hrane, farmaceutskih proizvoda, kozmetike i gnojiva. Držati zaštićeno od vlage, izvora topline i plamena te direktne sunčeve svjetlosti. Odvod u podu ne smije biti usmjeren u kanalizaciju. Skladište mora biti obilježeno sukladno Zakonu o kemikalijama.

Upute za sigurno odlaganje biocidnog pripravka i njegove ambalaže: prazna ambalaža, ostaci neupotrijebljenog sredstva ili sredstva kojemu je istekao rok, predaju se na zbrinjavanje pravnoj osobi ovlaštenoj za sakupljanje opasnog otpada. (Word to PDF Converter - Unregistered) <http://www.Word-to-PDF-Converter.net> Ovaj dokument sukladan je odobrenju Hrvatskog zavoda za toksikologiju, klasa br. 060-08-01/10-286, ur. br.

02-01/10-1783.

Ovom ovjerom poništava se ovjera deklaracije i upute koja je izdana pod klasom br. **060-08-01/10-082, ur. br. 02-01/10-0528 od 11.03.2010.**

-

 (Word to PDF Converter - Unregistered) <http://www.Word-to-PDF-Converter.net>Ovaj dokument
sukladan je odobrenju Hrvatskog zavoda za toksikologiju, klasa br. 060-08-01/10-286, ur. br.
02-01/10-1783.

Ovom ovjerom poništava se ovjera deklaracije i upute koja je izdana pod klasom br. 060-08-01/10-082, ur. br. 02-01/10-0528 od **11.03.2010.**

-

Irena Zorica Ježić Vidović, dipl. ing.