

Naziv biocida: Bromotrid žitni mamac

Vrsta i oblik pripravka: Gotovi rasuti mamac na bazi žitarica. U mamac je dodana gorka tvar.

Namjena: Rodenticid

Aktivna tvar i koncentracija u metričkim jedinicama: jedan kilogram mamca sadrži 0,05 g bromadiolona

Oznake obavijesti:

- S2 Čuvati izvan dohvata djece
- S13 Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane
- S 20/21 Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti
- S22 Ne udisati prašinu
- S 36/37 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice
- S46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik
- S49 Čuvati samo u originalnom spremniku

Upute za uporabu i doziranje:

BROMOTRID ŽITNI MAMAC su već pripremljeni mamci crvenkaste boje za direktnu primjenu protiv štetnih glodavaca u unutarnjim i vanjskim prostorima, u području javnoga zdravstva, komunalne higijene i veterinarstvu. Postavljaju se u blizini i u samim nastambama glodavaca, u kutove zidova i duž staza kojima se glodavci kreću te na mjestima hranjenja.

BROMOTRID ŽITNI MAMAC su antikoagulantni mamci za jednokratno hranjenje. Mamcima je potrebno od jednom tretirati što veći prostor.

BROMOTRID ŽITNI MAMAC se dozira u namjenske kutijice za deratizaciju ili direktno u nastambe glodavaca u količini 5–10 g ili jedna jušna žlica. Mamci se redovito trebaju nadomjestiti ovisno o dinamici konzumacije. Uginule glodavce treba ukloniti kako ne bi došlo do sekundarnog trovanja.

Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

Podaci o bilo kakvoj opasnosti po okoliš: aktivna tvar bromadiolon je toksičan za ribe i životinje koje se koriste kao hrana ribama i za alge. BROMOTRID ŽITNI MAMACI ne smiju biti na dohvatu maloj djeci, domaćih životinja, peradi i divljači.

Količina: otisnuta na pakiranju

Datum proizvodnje: otisnuta na pakiranju

Rok trajanja: 3 godine

Broj šarže ili serijski broj: otisnuta na pakiranju

Klasa i urudžbeni broj odobrenja MZSS: Klasa: UP/I-543-04/10-05/172, Ur.br. 534-08-01-4/3-10-2 (od 14.4.2010.)

Proizvođač: Pestrid d.o.o. Bilje, Šandora Petefija 109, 31 327 Bilje, Tel. 031/750-166

Zemlja podrijetla: Hrvatska

Napomena: Pročitaj priloženu uputu prije uporabe.

Ovaj dokument sukladan je odobrenju Hrvatskog zavoda za toksikologiju, klasa br. 060-08-01/10-286, ur. br. 02-01/10-1783.

Ovom ovjerom poništava se ovjera deklaracije i upute koja je izdana pod klasom br. 060-08-01/10-082, ur. br. 02-01/10-0528 od 11.03.2010.

-

Naziv biocida: Bromotrid žitni mamac
Vrsta i oblik pripravka: Gotovi rasuti mamac na bazi žitarica. U mamac je dodana gorka tvar.
Namjena: RODENTICID

UPUTA ZA UPORABU I SIGURAN RAD

Razdoblje potrebno za biocidni učinak: 3 do 7 dana

Vrijeme koje mora proteći između dviju primjena biocidnog pripravka: kontrolu pojedenosti mamaca potrebno vršiti svakih 14 dana i po potrebi nadopunjavati hrpice. Postupak ponavljati do potpunog suzbijanja glodavaca.

Mjesta primjene: BROMOTRID ŽITNI MAMAC su već pripremljeni mamci crvenkaste boje za direktnu primjenu protiv glodavaca. Pogodni su za primjenu i u suhim unutarnjim i vanjskim prostorima. Postavljaju se u blizini i u samim nastambama glodavaca, u kutove zidova i duž staza kojima se glodavci kreću te na mjestima hranjenja.

Upute o mjerama opreza tijekom uporabe:

Osigurati da primjenu preparata provode za to osposobljene osobe. Kod rada ne jesti, piti niti pušiti. Pri radu s preparatom potrebno je provoditi opće mjere zaštite na radu te koristiti osobnu zaštitnu opremu. U normalnim uvjetima pri dobroj ventilaciji, zaštita dišnog sustava nije potrebna. Ukoliko dođe do prašenja, koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica (HRN EN 149). Ruke zaštititi gumenim rukavicama (HRN EN 374), a tijelo laganim zaštitnim pamučnim odijelom dugih rukava. Nakon rada dobro oprati ruke i izložene dijelove tijela vodom i sapunom. Kontaminiranu odjeću skinuti.

Simptomi trovanja:

Simptomi trovanja obično nastaju s latencijom 16-72 sata, a to su: malaksalost, umor, nesiguran hod, krvarenje različitog stupnja na koži i sluznici, hematurija, krvava stolica, a može doći i do teških krvarenja u mozgu, perikardu, toraksu, nadbubrežnim žlijezdama, retini i probavnom traktu.

Udisanje: može se pojaviti krvarenje iz sluznice nosa te ostalih dijelova respiratornog sustava. **Dodir s kožom:** može doći do iritacije koja uključuje crvenilo, a može doći i do potkožnog krvarenja. **Gutanje:** može se pojaviti krvarenje u usnoj šupljini, ždrijelu, s iznenadnim bolovima u trbuhu, s pojavom krvi u mokraći i stolici.

Upute za pružanje prve pomoći:

Nakon udisanja: unesrećenu osobu izvesti iz kontaminiranog prostora na svjež zrak. U slučaju pojave ili zadržavanja simptoma, potražiti savjet liječnika ili prevesti unesrećenog u najbližu bolnicu. **Nakon dodira s kožom:** skinuti kontaminiranu odjeću i obuću. Mjesta dodira ispirati s tekućom vodom i blagom sapunicom 15-ak minuta. U slučaju pojave i zadržavanja simptoma, potražiti pomoć liječnika. **Nakon dodira s očima:** čistim prstima razmaknuti kapke te ispirati oči naizmjenični s tekućom vodom 15-ak minuta. U slučaju zadržavanja simptoma, potražiti pomoć oftalmologa. **Nakon gutanja:** Ne izazivati povraćanje, isprati usta s malo vode i ispljunuti, odmah prevesti unesrećenog u najbližu zdravstvenu ustanovu.

ANTIDOT: VITAMIN K1.

Postupci u slučaju nesreće:

Rasuto sredstvo, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava treba temeljito mehanički sakupiti i staviti u spremnik koji je predviđen za tu namjenu. Stvaranje prašine svesti na najmanju moguću mjeru. Zagađena podloga se potom opere smjesom vode i deterdženta, koja se nakon upotrebe treba odložiti u kontejner s otpadnim sredstvom.

Ako je prostor zahvatio požar, odmah se pristupa gašenju s CO₂, prahom, pjenom otpornom na alkohol ili vodenom maglom uz obveznu upotrebu samostalnog uređaja za disanje (npr. sa stlačenim zrakom - HRN EN 137) i termootpornog odijela.

Nakon čišćenja ili gašenja požara, osoba koja je to radila treba se otuširati.

U slučaju većih prosipavanja, dospijevanja u okoliš ili požara, obavijestiti odgovornu osobu i DUZS na broj 112. U slučaju požara, obavijestiti odgovornu osobu i DUZS.

Upute o mjerama opreza tijekom skladištenja:

Skladištiti samo u zatvorenom originalnom pakovanju, u posebnoj prostoriji izvan dohvata djece, na suhom, prohladnom i dobro zračenom mjestu, odvojeno od hrane, pića i stočne hrane, farmaceutskih proizvoda, kozmetike i gnojiva. Držati zaštićeno od vlage, izvora topline i plamena te direktne sunčeve svjetlosti. Odvod u podu ne smije biti usmjeren u kanalizaciju. Skladište mora biti obilježeno sukladno Zakonu o kemikalijama.

Upute za sigurno odlaganje biocidnog pripravka i njegove ambalaže: prazna ambalaža, ostaci neupotrijebljenog sredstva ili sredstva kojemu je istekao rok, predaju se na zbrinjavanje pravnoj osobi ovlaštenoj za sakupljanje opasnog otpada.

Ovaj dokument sukladan je odobrenju Hrvatskog zavoda za toksikologiju, klasa br. 060-08-01/10-286, ur. br. 02-01/10-1783.

Ovom ovjerom poništava se ovjera deklaracije i upute koja je izdana pod klasom br. 060-08-01/10-082, ur. br. 02-01/10-0528 od 11.03.2010.

-